

.....
SKALA GLASGOW imię i nazwisko , pesel pacjenta

Lp.	Ocenie podlega:	Wynik
1	<ul style="list-style-type: none">• Otwieranie oczu<ul style="list-style-type: none">○ 4 punkty – spontaniczne○ 3 punkty – na polecenie○ 2 punkty – na bodźce bólowe○ 1 punkt – nie otwiera oczu	
2	<ul style="list-style-type: none">• Kontakt słowny<ul style="list-style-type: none">○ 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby○ 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent dezorientowany○ 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk○ 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie○ 1 punkt – bez reakcji	
3	<ul style="list-style-type: none">• Reakcja ruchowa<ul style="list-style-type: none">○ 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych○ 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy○ 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego○ 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)○ 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdzenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)○ 1 punkt – bez reakcji	
4	Łączna suma punktów:	
5	<p>Uwzględnia się najlepszą uzyskaną odpowiedź w każdej kategorii. Łącznie można uzyskać od 3 do 15 punktów, ale należy zaznaczyć z jakich składowych powstał wynik (np. GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6).</p> <p>Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none">• GCS 13–15 – łagodne• GCS 9–12 – umiarkowane• GCS 6–8 – brak przytomności• GCS 5 – odkorowanie• GCS 4 – odmóżdzenie• GCS 3 – śmierć mózgowa <p>Skala Glasgow może być stosowana u dzieci, które już dobrze mówią, tj. od 4 roku życia.</p>	

.....
data, pieczęć, podpis LEKARZA ubezpieczenia zdrowotnego
albo lekarza zakładu opiekuńczo-leczniczego